

【悪性リンパ腫】

レジメン識別番号：2017243

療 法 名	[90mg/m2] ベンダムスチン療法（リツキシマブ併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫（未治療の場合）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day1・2 (or Day2・3)

レジメン識別番号：2016231

療 法 名	モガムリズマブ 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CCR4陽性の成人T細胞性白血病リンパ腫 再発又は難治性のCCR4陽性の末梢性T細胞リンパ腫 再発又は難治性のCCR4陽性の皮膚T細胞性リンパ腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
モガムリズマブ	1mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2015227

療 法 名	リツキシマブ併用BD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発・治療抵抗性マントル細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	点滴	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1～4

レジメン識別番号：2014220

療 法 名	ブレントキシマブベドチン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性のCD30陽性のホジキンリンパ腫及び未分化大細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ブレントキシマブベドチン	1.8mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014219

療 法 名	GEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014213

療 法 名	[120mg/m2] ベンダムスチン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫(再発又は難治性の場合)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベンダムスチン	120mg/m ²	点滴	Day1・2

レジメン識別番号：2014210

療 法 名	VNCOP-B 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	56日 (8週)

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロフォスファミド	300mg/m ²	点滴	Week 1, 3, 5, 7
ミトキサントロン	10mg/m ²	点滴	Week 1, 3, 5, 7
ビンクリスチン	2mg/body	点滴	Week 2, 4, 6, 8
エトポシド	150mg/m ²	点滴	Week 2, 6
フレオマイシン	10mg/m ²	点滴	Week 4, 8
フレドニゾロン	40mg/body	経口	毎日、7、8週は漸減

レジメン識別番号：2014208

療 法 名	グラドリピン・ミトキサントロン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
グラドリピン	5mg/m ²	点滴	Day1・2・3
ミトキサントロン	12mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014205

療 法 名	メトトレキサート・ロイコボリン救援 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫の中枢神経系への浸潤	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトトレキサート	3.5g/m ²	点滴	Day1

※ロイコボリン注を1回15mg/m2、通常メトトレキサート投与終了後、4時間後から3時間ごとに9回投与、以降6時間ごとに、8回投与する。

レジメン識別番号：2014204

療 法 名	Hyper-CVAD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	300mg/m ² ×2 (朝夕12 h 毎)	点滴	Day1・2・3
ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴	Day4
ビンクリスチン	2mg/body	点滴	Day4・11
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1・2・3・4・11・12・13・14

レジメン識別番号：2014203

療 法 名	HD-MTX-Ara-C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	急性リンパ性白血病、悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトトレキサート	200mg/m ²	点滴（2時間）	Day1
メトトレキサート	800mg/m ²	点滴（24時間）	Day1
シタラビン	2g/m ² ×2 (朝夕12 h 毎)	点滴	Day2・3

メトトレキサート（800mg/m²）投与後6時間後より、ロイコボリン15mgを6時間ごとに計8回投与する。

レジメン識別番号：2014195

療 法 名	C－MOPP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ホジキンリンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	650mg/m ²	点滴	Day1・8
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴	Day1・8
塩酸プロカルバジン	100mg/m ²	経口	Day1～14
プレドニゾン	40mg/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2014193

療 法 名	CHASE 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロfosファミド	1200mg/m ²	点滴	Day1
シタラビン	2000mg/m ²	点滴	Day2・3
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day1～3
デキサメタゾン	40mg/ body	経口	Day1～3

レジメン識別番号：2014192

療 法 名	F C M 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発性、不応性のろ胞性リンパ腫・マントル細胞リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フルダビン	25mg/m ²	点滴	Day1・2・3
シクロfosファミド	200mg/m ²	点滴	Day1・2・3
ミトキサントロン	8mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014189

療 法 名	ESHAP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	40mg/m ²	点滴	Day1～4
メチルプレドニゾン	500mg/ body	点滴	Day1～5
シタラビン	2000mg/m ²	点滴	Day5
シスプラチン	25mg/m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号：2014188

療 法 名	EPOCH 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	50mg/m ²	点滴	Day1～4
ビンクリスチン	0.4mg/m ²	点滴	Day1～4
ドキソルビシン	10mg/m ²	点滴	Day1～4
シクロfosファミド	750mg/m ²	点滴	Day6
プレドニゾン	60mg/m ²	経口	Day1～6

レジメン識別番号：2014187

療 法 名	D e V I C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	300mg/m ²	点滴	Day1
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day1～3
イfosファミド	1500mg/m ²	点滴	Day1～3
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～3

レジメン識別番号：2014186

療 法 名	L S G 1 5 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	成人 T 細胞白血病／リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	1mg/m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	350mg/m ²	点滴	Day1
ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴	Day1・8
ラニムスチン	60mg/m ²	点滴	Day8
ビンデシン	2.4mg/m ²	点滴	Day15
カルボプラチン	250mg/m ²	点滴	Day15
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day15～17
フレドニゾン	40mg/m ²	経口	Day1、8、15～17
フィルグラスチム	75μ/body	皮下注	Day2～6、9～13、18～28

レジメン識別番号：2014185

療 法 名	THP-COP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビラルビン	30mg/m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	500mg/m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1mg/m ²	点滴	Day1
フレドニゾン	30mg/m ²	経口	Day1～5

レジメン識別番号：2014184

療 法 名	CHOP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シクロフォスファミド	750mg/m ²	点滴	Day1
ドキソルビシン	50mg/m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1.4mg/m ²	点滴	Day1
フレドニゾン	100mg/body	経口	Day1～5

レジメン識別番号：2014183

療 法 名	リツキシマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014182-1

療 法 名	ABVD (DTIC : 375mg/m ²)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ホジキンリンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	点滴	Day1・15
ブレオマイシン	9mg/m ²	点滴	Day1・15
ビンブラスチン	6mg/m ²	点滴	Day1・15
ダカルバジン	375mg/m ²	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014182-2

療 法 名	ABVD (DTIC : 250mg/m ²)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ホジキンリンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	25mg/m ²	点滴	Day1・15
ブレオマイシン	9mg/m ²	点滴	Day1・15
ビンブラスチン	6mg/m ²	点滴	Day1・15
ダカルバジン	250mg/m ²	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2019282

療 法 名	オビマツズマブ/ベンダムスチン療法 (G-B療法)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オビマツズマブ	1000mg/body	点滴	1コース目 : Day1・8・15 2～6コース目 : Day1のみ
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day1・2 (or Day2・3)

レジメン識別番号：2019283

療 法 名	オビマツズマブ単独療法 (維持療法)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CD20陽性の濾胞性リンパ腫	2ヶ月

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オビマツズマブ	1000mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019286

療 法 名	ロミデプシン療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の末梢性T細胞リンパ腫	28日分

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ロミデプシン	14mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号： 2021330

療 法 名	ブスルファン+チオテパ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫（自家末梢血幹細胞移植の前処置）	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ブスルファン	3.2m g /kg	点滴	Day1～4
チオテパ	5mg/kg	点滴	Day5～6

レジメン識別番号： 2021338-1

療 法 名	リツキシマブ+ボラツズマブベドチン+ベンダムスチン（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発または難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ボラツズマブベドチン	1.8mg/kg	点滴	Day2
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day2・3

レジメン識別番号： 2021338-2

療 法 名	リツキシマブ+ボラツズマブベドチン+ベンダムスチン（2サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発または難治性のびまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
ボラツズマブベドチン	1.8mg/kg	点滴	Day2
ベンダムスチン	90mg/m ²	点滴	Day1・2

レジメン識別番号： 2021343-1

療 法 名	A+AVD（DTIC：375mg/m ² ）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫・ホジキン病	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ブレンツキシマブベドチン	1.2mg/kg	点滴	Day1
ドキソルビシン	25mg/m ²	点滴	Day1
ビンブラスチン	6mg/m ²	点滴	Day1
ダカルバジン	375mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021343-2

療 法 名	A+AVd（DTIC：250mg/m ² ）	1　ク　ー　ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫・ホジキン病	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フレンツキシマブベドチン	1.2mg/kg	点滴	Day1
ドキシルピシン	25mg/m ²	点滴	Day1
ビンブラスチン	6mg/m ²	点滴	Day1
ダカルバジン	250mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022365

療 法 名	SMILE	1　ク　ー　ル
対 象 疾 患	節外性NK/T細胞性リンパ腫・アグレッシブNK細胞性白血病	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトレキサート	2g/m ²	点滴	Day1
イホスファミド	1500mg/m ²	点滴	Day2・3・4
エトポシド	100mg/m ²	点滴	Day2・3・4
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day2・3・4
L-アスパラギナーゼ	6000U/m ²	点滴	Day8・10・12・14・16・18・20

レジメン識別番号：2022381

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1　ク　ー　ル
対 象 疾 患	再発または難治性の古典的ホジキンリンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day 1

レジメン識別番号：2024395

療 法 名	Pola-R-CHP	1　ク　ー　ル
対 象 疾 患	初発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ボラツズマブベドチン	1.8mg/kg	点滴	Day1
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
シクロホスファミド	750mg/m ²	点滴	Day1
ドキシルピシン	50mg/m ²	点滴	Day1
ブレドニゾロン	100mg/body	点滴/内服	Day1～5

レジメン識別番号：2024404-1

療 法 名	エブリタマブ <1サイクル目>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	細胞型B細胞リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エブリタマブ	0.16mg/body	皮下注	Day1
エブリタマブ	0.8mg/body	皮下注	Day8
エブリタマブ	48mg/body	皮下注	Day15・22

レジメン識別番号：2024404-2

療 法 名	エブリタマブ <2-3サイクル目>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	細胞型B細胞リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エブリタマブ	48mg/body	皮下注	Day1・8・15・22

レジメン識別番号：2024404-3

療 法 名	エブリタマブ <4-9サイクル目>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	細胞型B細胞リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エブリタマブ	48mg/body	皮下注	Day1・15

レジメン識別番号：2024404-4

療 法 名	エブリタマブ <10サイクル目以降>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	細胞型B細胞リンパ腫、高悪性度B細胞リンパ腫、原発性縦隔大細胞型B細胞リンパ腫) 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エブリタマブ	48mg/body	皮下注	Day1

レジメン識別番号：2024405

療 法 名	リツキシマブ併用エトポシド内服	1 ク ー ル
対 象 疾 患	B細胞性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
エトポシド	25～50mg	内服	Day1～14(21)

レジメン識別番号：2024406

療 法 名	MTX-HOPE	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療抵抗性非ホジキンリンパ腫	14（～28）日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メトレキサート	20mg	経口	Day1
ヒドロコルチゾン	100mg	静注	Day2
ビンクリスチン	1mg	点滴	Day2
エトポシド	25mg	経口	Day3～4
ソブゾキサン	400mg	経口	Day3～4

レジメン識別番号：2025453

療 法 名	R-MPV	1 ク ー ル
対 象 疾 患	中枢神経原発悪性リンパ腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
メトレキサート	3.5g/m ²	点滴	Day2
ビンクリスチン	1.4mg/m ² (最大2mg)	点滴	Day2
プロカルバジン	100mg/m ²	経口	Day1～7(奇数サイクルのみ)

レジメン識別番号：2025454

療 法 名	MATRIX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	中枢神経原発悪性リンパ腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
リツキシマブ	375mg/m ²	点滴	Day1
メトレキサート	3.5g/m ²	点滴	Day2
シタラビン	2000mg/m ² × 2回	点滴	Day3～4
チオデバ	30mg/m ²	点滴	Day5

レジメン識別番号：2025455

療 法 名	LEED	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性リンパ腫の自家移植併用大量化学療法	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	500mg/m ²	点滴	Day1～3
シクロホスファミド	60mg/kg	点滴	Day1～2
メルファラン	130mg/m ²	点滴	Day4
デキサメタゾン	33mg/body	点滴	Day1～4

【多発性骨髄腫】

レジメン識別番号：2014179

療 法 名	V A D	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	0.4mg/day	持続点滴	Day1～4
ドキソルビシン	9mg/m ²	持続点滴	Day1～4
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～4、9～12、17～20

レジメン識別番号：2014207

療 法 名	ボルテゾミブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	点滴	Day1・4・8・11

レジメン識別番号：2014209

療 法 名	ROAD 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビンクリスチン	1.2mg/m ²	点滴	Day1
ラニムスチン	40mg/m ²	点滴	Day1
メルファラン	8mg/m ²	経口	Day1～6
デキサメタゾン	40mg/body	点滴	Day1～4、9～12、17～20

レジメン識別番号：2018261-1

療 法 名	Kd 療法（1コース目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号：2018261-2

療 法 名	Kd 療法（2コース目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2016240-1

療 法 名	KRd 療法（1コース目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
レナリドミド	25mg/body	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2016240-2

療 法 名	KRd 療法（2～12コース目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
レナリドミド	25mg/body	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/body	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2016240-3

療 法 名	KRd 療法（13コース目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルフィルゾミブ	27mg/m ²	点滴	Day1・2・15・16
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/日	経口	Day1・8・15・22

レジメン識別番号： 2017257-1

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（1～2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2017257-2

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（3～6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・15
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2、8～14のいずれか、15・16、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2017257-3

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン療法（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1
レナリドミド	25mg/日	経口	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口or点滴	Day 1・2、8～14のいずれか、15～21のいずれか、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2017256-1

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（1～3サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口or点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号： 2017256-2

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（4～8サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1
ボルテゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口or点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号： 2017256-3

療 法 名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン療法（9サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2021331-1

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（1サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	8mg/kg	点滴	Day1・2
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day8・15・22
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号： 2021331-2

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号： 2021331-3

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（3-6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1・15
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号： 2021331-4

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	16mg/kg	点滴	Day1
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	20mg/body	経口	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号：2021339-1

療 法 名	イサツキシマブ + ボマリドミド + デキサメタゾン（1サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イサツキシマブ	10mg/kg	点滴	Day1・8・15・22
ボマリドミド	4mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・8・15・22

レジメン識別番号：2021339-2

療 法 名	イサツキシマブ + ボマリドミド + デキサメタゾン（2サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イサツキシマブ	10mg/kg	点滴	Day1・15
ボマリドミド	4mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・8・15・22

レジメン識別番号：2021340-1

療 法 名	ダラツムマブ + ボルデゾミブ + デキサメタゾン（1-3サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・8・15
ボルデゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口/点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号：2021340-2

療 法 名	ダラツムマブ + ボルデゾミブ + デキサメタゾン（4-8サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1
ボルデゾミブ	1.3mg/m ²	静注/皮下	Day1・4・8・11
デキサメタゾン	80mg/週	経口/点滴	Day 1・2・4・5・8・9・11・12

レジメン識別番号：2021340-3

療 法 名	ダラツムマブ + ボルデゾミブ + デキサメタゾン（9サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1

レジメン識別番号： 2021341-1

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン（1-2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・8・15・22
レナリドミド	25mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号： 2021341-2

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン（3-6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・15
レナリドミド	25mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2、8～14のいずれか、15・16、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2021341-3

療 法 名	ダラツムマブ+レナリドミド+デキサメタゾン（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1
レナリドミド	25mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2、8～14のいずれか、15～21のいずれか、22～28のいずれか

レジメン識別番号： 2021342-1

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（1サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・2・8・15・22
カルフィルゾミブ	20mg/m ²	点滴	Day1・2
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day8・9・15・16
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号： 2021342-2

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・2・8・15・22
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号：2021342-3

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（3-6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・15
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号：2021342-4

療 法 名	ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1
カルフィルゾミブ	56mg/m ²	点滴	Day1・2・8・9・15・16
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day1・2・8・9・15・16・22

レジメン識別番号：2021349-1

療 法 名	ダラツムマブ+ボマリドミド+デキサメタゾン（1-2サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・8・15・22
ボマリドミド	4mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・2・8・9・15・16・22・23

レジメン識別番号：2021349-2

療 法 名	ダラツムマブ+ボマリドミド+デキサメタゾン（3-6サイクル）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1・15
ボマリドミド	4mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・2・8・15・16・22

レジメン識別番号：2021349-3

療 法 名	ダラツムマブ+ボマリドミド+デキサメタゾン（7サイクル以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	多発性骨髄腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダラツムマブ	15mL	皮下	Day1
ボマリドミド	4mg/body	内服	Day1～21
デキサメタゾン	40mg/週	経口/点滴	Day 1・2・8・15・22

レジメン識別番号：2024436-1

療 法 名	エルラナタマブ <ステップアップ用量>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の多発性骨髄腫	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エルラナタマブ	12mg	皮下	Day1
エルラナタマブ	32mg	皮下	Day4

レジメン識別番号：2024436-2

療 法 名	エルラナタマブ <標準用量>	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は難治性の多発性骨髄腫	7-14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エルラナタマブ	76mg	皮下	Day1

【骨髄異形成症候群】

レジメン識別番号：2014179

療 法 名	C A G 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髄異形成症候群	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シタラビン（朝）	10mg/m ²	皮下注	Day2～15
シタラビン（夕）	10mg/m ²	皮下注	Day1～14
アクリルピシン	14mg/m ²	点滴	Day1～4
フィルグラスチム	75μ/ body	皮下注	Day1～14

※シタラビンの皮下注は、持続静脈内投与に変更することも可能。

レジメン識別番号：2014191

療 法 名	MDS2 0 0 維持 6ケル目	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髄異形成症候群	30日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エノシタビン	170mg/m ²	点滴	Day1～15
エトボシド	80mg/m ²	点滴	Day1・3・5
ビンデシン	2mg/m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014214

療 法 名	アザシチジン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	骨髄異形成症候群	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アザシチジン	75mg/m ²	点滴	Day1～7

【大腸癌】

レジメン識別番号：	2014023		
療 法 名	5-FU/I-LV(simplified LV5FU2法) 療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
レボホリナートカルシウム	200mg /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：	2014018-1		
療 法 名	FOLFOX療法（大腸癌・進行再発）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	14	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85mg /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：	2014018-2		
療 法 名	FOLFOX療法（大腸癌・術後補助）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	大腸癌（術後補助）	14	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85mg /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：	2014040		
療 法 名	SOX療法（大腸癌・進行再発）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg /㎡	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：	2014041		
療 法 名	FOLFIRI療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150mg /㎡	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85mg /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：	2014058		
療 法 名	FOLFIRI療法（大腸癌・進行再発）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150mg /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2014060-1

療 法 名	CPT-11療法（B法・大腸癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発大腸癌	49日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150mg /㎡	点滴	D a y 1・15・29

レジメン識別番号：2014065

療 法 名	X E L O X 療法（大腸癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カペシタビン	2000mg /㎡	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2014066

療 法 名	IRIS療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能進行再発大腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg /㎡	経口	Day1～14
イリノテカン	125mg /㎡	点滴	D a y 1・15

レジメン識別番号：2014272-2

療 法 名	ベムプロリズムブ（3週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌（フッ化ピリミジン系抗癌性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカンによる治療歴がある患者に限る。）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズムブ	200mg/body	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2020311

療 法 名	ベムブロリズマブ（6週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌（フツ化ピリミジン系抗悪性腫瘍剤、オキサリプラチン及びイリノテカンによる治療歴がある患者に限る。）	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400mg/body	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2022372-1

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2022372-2

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2022373

療 法 名	ニボルマブ＋イピリムマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	D a y 1
イピリムマブ	1mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2022374

療 法 名	ペルツズマブ＋トラスツズマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペルツズマブ	420mg/body （初回のみ840mg）	点滴	D a y 1
トラスツズマブ	6mg/kg （初回のみ8mg/kg）	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014022

療 法 名	Bmab + FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg or 10mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014036

療 法 名	S-1/CPT-11/Bmab 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /㎡	経口	Day1～14
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15
イリノテカン	125m g /㎡	点滴	D a y 1・15

レジメン識別番号： 2014037

療 法 名	Bmab + SOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /㎡	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	130m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014059

療 法 名	Bmab + FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014064

療 法 名	Bmab + X E L O X 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カベシタピン	2000m g /㎡	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	130m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2018260

療 法 名	Bmab+トリフルリジン/チピラシル塩酸塩 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トリフルリジン/チピラシル塩酸塩	トリフルリジン： 約35m g /m2/回 ※別表参照	経口	Day1～5 Day8～12
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15

＜別表＞：ロンサーフの初回基準量（トリフルリジン相当量）

体表面積	初回基準量	1回量について製 品の組み合わせ
1.07未満	70mg/日（35mg/回）	20mg × 1 錠 + 15mg×1錠
1.07～1.23未満	80mg/日（40mg/回）	20mg×2錠
1.23～1.38未満	90mg/日（45mg/回）	15mg×3錠
1.38～1.53未満	100mg/日（50mg/ 回）	20mg × 1 錠 + 15mg×2錠
1.53～1.69未満	110mg/日（55mg/ 回）	20mg × 2 錠 + 15mg×1錠
1.69～1.84未満	120mg/日（60mg/ 回）	20mg×3錠 （15mg×4錠も 可）
1.84～1.99未満	130mg/日（65mg/ 回）	20mg × 1 錠 + 15mg×3錠
1.99～2.15未満	140mg/日（70mg/ 回）	20mg × 2 錠 + 15mg×2錠
2.15以上	150mg/日（75mg/ 回）	20mg × 3 錠 + 15mg×1錠 （15mg×5錠も 可）

レジメン識別番号： 2018266

療 法 名	Bmab+UFT/LV 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ウラシル	300mg/m2/日（分3） ※別表参照	経口	Day1～21
ホリナートカルシウム	75m g /日（分3）	経口	Day1～21
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15

＜別表＞

体表面積（m2）	1日投与量	投与スケジュール		
		午前	午後	夜間
<1.17	300mg/日	100mg	100mg	100mg
1.17～1.49	400mg/日	200mg	100mg	100mg
1.50～1.83	500mg/日	200mg	200mg	100mg
> 1.83	600mg/日	200mg	200mg	200mg

レジメン識別番号：2018267

療 法 名	Bmab+ FOLFOXIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ（アバスチン）	5mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2019277

療 法 名	Bmab+ CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	10mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2019287

療 法 名	Bmab+カベシタビン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カベシタビン	2000m g /㎡	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2020294

療 法 名	Bmab+ S-1（3週/cycke）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /㎡	経口	Day1～14
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2020295

療 法 名	Bmab+ S-1（6週/cycke BASIC試験）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /㎡	経口	Day1～28
ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	D a y 1・15・29

レジメン識別番号： 2023388

療 法 名	S-1+IRI+BEV（3週/cycle）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の大腸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg/m ²	経口	Day1～14
イリノテカン	150mg/m ²	点滴	D a y 1
ペバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014025

療 法 名	Cmab単独療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014063

療 法 名	Cmab＋CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
イリノテカン	150mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014073

療 法 名	Cmab＋FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
イリノテカン	150mg/m ²	点滴	D a y 1
レボリナートカルシウム	200mg/m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014074

療 法 名	Cmab+ FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降： 250mg/m ²	点滴	D a y 1・8
オキサリプラチン	85m g /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2023389-1

療 法 名	ENCO+BINI+CET（1週/cycle）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	D a y 1
エンコラフェニブ	300m g /日	内服	D a y 1～7
ビメチニブ	90m g /日	内服	D a y 1～7

レジメン識別番号： 2023389-2

療 法 名	ENCO+BINI+CET（2週/cycle）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	500mg/m ²	点滴	D a y 1
エンコラフェニブ	300m g /日	内服	D a y 1～14
ビメチニブ	90m g /日	内服	D a y 1～14

レジメン識別番号： 2023390-1

療 法 名	ENCO+CET（1週/cycle）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	D a y 1
エンコラフェニブ	300m g /日	内服	D a y 1～7

レジメン識別番号： 2023390-2

療 法 名	ENCO+CET（2週/cycle）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したBRAF遺伝子変異を有する 治癒切除不能な進行再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	500mg/m ²	点滴	D a y 1
エンコラフェニブ	300m g /日	内服	D a y 1～14

レジメン識別番号：2014035

療 法 名	Pmab+CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2014067

療 法 名	Pmab単独療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2014068

療 法 名	Pmab+FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2014069

療 法 名	Pmab+FOLFOX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	K-RAS 遺伝子野生型の 治療切除不能の進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パニツムマブ	6mg/kg	点滴	D a y 1
オキサリプラチン	85m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2016242

療 法 名	ラムシルマブ+FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2016242

療 法 名	アフリベルセプト ベータ+ FOLFIRI療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アフリベルセプト ベータ	4mg/kg	点滴	D a y 1
イリノテカン	150m g /㎡	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200m g /㎡	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400m g /㎡	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400m g /㎡	持続点滴	D a y 1

【胃癌】

レジメン識別番号：2014008

療 法 名	W e e k l y T a x o l 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80m g /㎡	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014009

療 法 名	DTX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014010

療 法 名	C P T - 1 1 ／ T S - 1 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /㎡	経口	Day1～28
イリノテカン	80m g /body	点滴	Day1・15・29

レジメン識別番号：2014012

療 法 名	C D D P ／ T S - 1 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /㎡	経口	Day1～21
シスプラチン	30m g /body	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014038

療 法 名	nab-PTX療法（3週毎）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	220m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014050

療 法 名	SOX療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg /㎡	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014051

療 法 名	S-1+DTX療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg /㎡	経口	Day1～14
ドセタキセル	40mg /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014052

療 法 名	C D D P / CPT-11 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40mg /㎡	点滴	Day1・15
イリノテカン	60mg /㎡	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014056

療 法 名	B i w e e k l yドセタキセル+ CPT-11療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌・切除不能胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	50mg /㎡	点滴	Day1・15
ドセタキセル	35mg /㎡	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2014060-2

療 法 名	CPT-11療法（胃癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	150mg /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014070

療 法 名	XP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治療切除不能な進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カベシタピン	2000mg /㎡	経口	Day1～14
シスプラチン	80mg /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2015230-1

療 法 名	X E L O X 療法（胃癌・術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌(術後補助)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カベシタビン	2000mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2015230-2

療 法 名	X E L O X 療法（胃癌・進行再発）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌(進行再発)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カベシタビン	2000mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2016233

療 法 名	SOX療法（胃癌・術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌（術後補助）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg/m ²	経口	Day1～14
オキサリプラチン	100mg/m ²	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2017252

療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型バクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	100mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2017254-2

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌（3rd line以降）	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019288

療 法 名	S-1+DTX 療法（胃癌・術後補助） [1～7コース目]	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胃癌（術後補助）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg g/m ²	経口	Day1～14 （1～7コース）
ドセタキセル	40mg g/m ²	点滴	D a y 1 （2～7コース）
備考	1コース目：S-1単剤療法（2週内服1週休薬） 2～7コース目：DTXを併用する。 8～11 or 12コース目：S-1単剤療法（4週内服2週休薬）		

レジメン識別番号：2020317

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発の胃癌（3rd line以降）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022368

療 法 名	ニボルマブ+FOLFOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER陰性の治癒切除不能進行・再発の胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg g/body	点滴	Day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	Day1

レジメン識別番号：2022369

療 法 名	ニボルマブ+SOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER陰性の治癒切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	3600mg g/body	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム（S-1）	80mg g/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2022370

療 法 名	ニボルマブ+CapeOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER陰性の治癒切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	3600mg g/body	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
カペシタビン	2000mg g/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2022371

療 法 名	FOLFOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	Day1

レジメン識別番号： 2024407

療 法 名	CapeOX+Pembrolizumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
カペシタビン	2000mg g/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024408-1

療 法 名	CDDP+5-FU+Pembrolizumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2024408-2

療 法 名	5-FU+Pembrolizumab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2024415

療 法 名	SOX+Pembrolizumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80mg g/m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024416

療 法 名	SP+Pembrolizumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
シスプラチン	60mg/m ²	点滴	Day1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024417

療 法 名	XP+Pembrolizumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	Day1
カベシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024426

療 法 名	カベシタピン+Pembrolizumab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陰性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
カベシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024427

療 法 名	ゾルベツキシマブ+CAPOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゾルベツキシマブ	600mg/m ² (初回のみ800mg/m ²)	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
カベシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号： 2024428

療 法 名	ゾルベツキシマブ+FOLFOX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	CLDN18.2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゾルベツキシマブ	400mg/m ² (初回のみ800mg/m ²)	点滴	Day1
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014049

療 法 名	Tmab+SP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /㎡	経口	Day1～14
シスプラチン	60m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2014071

療 法 名	Tmab+XP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能な進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
カベシタピン	2000m g /㎡	経口	Day1～14
シスプラチン	80m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2018259

療 法 名	Tmab+S0X 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
テガフル・ギメラシル ・オテラシルカリウム (S-1)	80m g /㎡	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2019278

療 法 名	Tmab+XELOX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2過剰発現が確認された治療切除不能進行・再発の胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	D a y 1
カベシタピン	2000m g /㎡	経口	Day1～14
オキサリプラチン	130m g /㎡	点滴	D a y 1

レジメン識別番号： 2020321

療 法 名	トラスツズマブ デルクステカン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法後に憎悪したHER2陽性の治療切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ デルクステカン	6.4mg/kg	点滴	D a y 1

レジメン識別番号：2023384

療 法 名	FOLFOX+Tmab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の胃癌	

			1クール14日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	400mg/m ²	ワンショット	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	Day1

			1クール21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1

レジメン識別番号：2015225

療 法 名	RAM+PTX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌（2ndライン以降）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1・15
バクリタキセル	80mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2017253

療 法 名	RAM+nab-PTX 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌（2ndライン以降）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1・15
アルブミン懸濁型バクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	100m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2019276

療 法 名	ラムシルマブ 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の胃癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025456-1

療 法 名	FP+Pembrolizumab+Tmab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2025456-2

療 法 名	5-FU + Pembrolizumab + Tmab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツズマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2025457-1

療 法 名	CAPOX + Pembrolizumab + Tmab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツズマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
カベシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2025457-2

療 法 名	カベシタピン + Pembrolizumab + Tmab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツズマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
カベシタピン	2000m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2025458-1

療 法 名	SOX + Pembrolizumab + Tmab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツズマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	Day1
デガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2025458-2

療 法 名	S-1 + Pembrolizumab + Tmab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の化学療法歴のない治癒切除不能な進行・再発胃癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
トラスツズマブ	6mg/kg（初回のみ8mg/kg）	点滴	Day1
デガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80m g /m ²	経口	Day1～14

【胆道癌】

レジメン識別番号：2014011

療 法 名	G E M療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胆道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014072

療 法 名	G E M + CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8
シスプラチン	25m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2019280

療 法 名	G E M + S-1療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能または進行胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8
S-1	60m g /㎡	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2023387-1

療 法 名	GEM+CDDP+Durvalumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body (30kg以下は20mg/kg)	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8
シスプラチン	25m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2023387-2

療 法 名	Durvalumab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body (30kg以下は20mg/kg)	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024409-1

療 法 名	GEM+CDDP+Pembrolizumab（200mg）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8
シスプラチン	25m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2024409-2

療 法 名	GEM+Pembrolizumab（200mg）維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2024410-1

療 法 名	GEM+CDDP+Pembrolizumab（400mg）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8・22・29
シスプラチン	25m g /㎡	点滴	Day1・8・22・29

レジメン識別番号：2024410-2

療 法 名	GEM+Pembrolizumab（400mg）維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な胆道癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8・22・29

【肝臓癌】

レジメン識別番号：2014054

療 法 名	E p i r u b i c i n+C D D P+5－F U(動注)療	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エビルピシン	20mg/body	動注	Day1
シスプラチン	25mg/body	動注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	動注	Day1

レジメン識別番号：2014055

療 法 名	E p i r u b i c i n+C D D P+5－F U(静注)療	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝癌の肺転移・リンパ節転移	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エビルピシン	20mg/body	静注	Day1
シスプラチン	25mg/body	静注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	静注	Day1

レジメン識別番号：2014155

療 法 名	DSM動注塞栓療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	14日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
エビルピシン	40mg/body	動注	Day1
マイトマイシンC	8mg/body	動注	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	500mg/body	動注	Day1

レジメン識別番号：2014156

療 法 名	Weekly Hight dose 5-FU Aretrial Infusion （WHFAI）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フルオロウラシル（5-FU）	1000m g /m ²	動注	Day1

レジメン識別番号：2014157

療 法 名	Low dose FP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	肝原発性肝癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	250m g / body	動注	Day1・4・8・11・15・18
フルオロウラシル（5-FU）	10m g / body	動注	Day1～5. 8～12. 15～19

レジメン識別番号：	2014158		
療 法 名	FEM 療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	肝原発性肝癌・転移性肝腫瘍	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エビルピシン	30mg/m ²	動注	Day1
マイトマイシンC	2.7mg/m ²	動注	Day1・15
フルオロウラシル（5-FU）	330mg/m ²	動注	Day1・8・15・22

レジメン識別番号：	2014159		
療 法 名	肝TAE療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	肝癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
エビルピシン	50mg /body	動注	Day1

レジメン識別番号：	2014162		
療 法 名	CDDP 肝動注	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	肝細胞癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン（アイエコール）	50mg/ body	動注	Day1

レジメン識別番号：	2014163		
療 法 名	ミリプラチン 肝動注	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	肝細胞癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ミリプラチン（ミリプラ）	60～120mg/ body	動注	Day1

レジメン識別番号：	2019281		
療 法 名	ラムシルマブ療法（肝細胞癌）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した血清AFP値が400ng/ml以上の切除不能な肝細胞癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2022322		
療 法 名	Bev/Atezolizumab	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	切除不能な肝細胞癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200mg/body	点滴	Day1
ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2023385

療 法 名	Tremelimumab+Durvalumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な肝細胞癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トレメリムマブ	300mg/body (30kg以下は4mg/kg)	点滴	Day1
デュルバルマブ	1500mg/body (30kg以下は20mg/kg)	点滴	Day1

レジメン識別番号：2023386

療 法 名	Durvalumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	治癒切除不能な肝細胞癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body (30kg以下は20mg/kg)	点滴	Day1

【膵臓癌】

レジメン識別番号：		2014011	
療 法 名	G E M療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	膵臓癌	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタピン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：		2014053	
療 法 名	5-FU+Radiation療法	1 クール	
対象疾患	膵臓癌	7日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
5-FU	250mg/body	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：		2014075	
療 法 名	FOLFIRINOX療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	治療切除不能な膵癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オキサリプラチン	85mg /m ²	点滴	D a y 1
イリノテカン	180mg /m ²	点滴	D a y 1
レボホリナートカルシウム	200mg /m ²	点滴	D a y 1
フルオロウラシル	400mg /m ²	ワンショット	D a y 1
フルオロウラシル	2400mg /m ²	持続点滴	D a y 1

レジメン識別番号：		2014076	
療 法 名	CPT-11療法（E法・膵癌）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	治療切除不能な膵癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	180mg /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2015223	
療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	胃癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル （nab-PTX・アブラキサン）	125mg /m ²	点滴	Day1・8・15
ゲムシタピン	1000mg /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2019279

療 法 名	G E M + S-1療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能または進行膵癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg /m ²	点滴	Day1・8
S-1	60mg /m ²	経口	Day1～14

レジメン識別番号：2021326-1,2

療 法 名	FL-nal-IRI	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカンリボソーム製剤	70mg/m ² （※50mg/m ² ）	点滴	Day1
レボホリナート	200mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	2400mg/m ²	持続点滴	Day1

※UGT1A1*6若しくはUGT1A1*28の純接合体を有する患者、又はUGT1A1*6及びUGT1A1*28のヘテロ接合体を有する患者では、1回50mg/m²を開始用量とする。忍容性が認められる場合には、1回70mg/m²に増量することができる。

【食道癌】

レジメン識別番号：2014001

療 法 名	FP+R a d i a t i o n療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	10mg/m ²	点滴	Day1～5. 8～12
フルオロウラシル（5-FU）	300mg/body	点滴	Day1～14

レジメン識別番号：2014002

療 法 名	CDDP+5-FU療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2014003

療 法 名	CDDP+5-FU療法（インフューザー使用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	3500m g /m ²	点滴	Day1（Day1-5まで持続注入）

レジメン識別番号：2014004

療 法 名	術前Ra+CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	26日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	5mg/日	点滴	20回

レジメン識別番号：2014005

療 法 名	ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014057

療 法 名	nedaplatin+docetaxel療法	1 クール
対 象 疾 患	再発食道癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネダプラチン	40mg/m ²	点滴	Day1
ドセタキセル	30mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020296

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 クール
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020318

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 クール
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2021344-1

療 法 名	ベムブロリズマブ（3週）	1 クール
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したP D - L 1 陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2021344-2

療 法 名	ベムブロリズマブ（6週）	1 クール
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪したP D - L 1 陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2021348-1

療 法 名	ベムブロリズマブ+CDDP+5-FU	1 クール
対 象 疾 患	根治切除不能な進行・再発の食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
シスプラチン	80mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2021348-2

療 法 名	ベムプロリズマブ+5-FU維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な進行・再発の食道癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
フルオロウラシル	800mg/m ²	点滴	Day1～5

【乳癌】

レジメン識別番号：2014008

療 法 名	W e e k l y T a x o l 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014019

療 法 名	ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ピルルピン	25m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014021

療 法 名	ドセタキセル単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014026

療 法 名	AC療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	60m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014028

療 法 名	TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	75m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014033

療 法 名	エリブリン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エリブリン	1.4m g /m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：		2014034	
療 法 名	アブラキサン単剤療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	乳癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型パクリタキセル	260m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2015229		
療 法 名	カドサイラ療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ エムタンシン	3.6m g /kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020301	
療 法 名	アテゾリズマブ/nab-PTX1 クー ル
対 象 疾 患	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌28日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量投与ルート投与日
アテゾリズマブ	840mg/body点滴Day1・15
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100mg /㎡点滴Day1・8・15

レジメン識別番号：	2020302		
療 法 名	トラスツズマブ デルクステカン	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	化学療法歴のあるHER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ デルクステカン	5.4m g /kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021345	
療 法 名	ベムプロリズマブ+GEM+CBDCA
対 象 疾 患	PD-L1陽性のホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌
	1 ク ー ル
	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：	2014014		
療 法 名	ハーセプチン療法（7日サイクル）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2mg/kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15・22

レジメン識別番号：		2014024	
療 法 名	ハーセプチン術後補助療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014015

療 法 名	ハーセプチン／Weekly Taxol 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2mg/kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15・22
パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014020

療 法 名	ハーセプチン+ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	2mg/kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15
ビレノルピン	25mg/m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014029

療 法 名	ハーセプチン+TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014030

療 法 名	ハーセプチン+ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラスツズマブ	6mg/kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014043

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014044

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+TC療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
ドセタキセル	75m g /㎡	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014045

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+ナベルピン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	2m g /kg (初回のみ4mg/kg)	点滴	Day1・8・15
ビレノルビン	25m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014046

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+アブラキサン単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
アルブミン懸濁型バクリタキセル	260m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014047

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+エリブリン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
エリブリン	1.4m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014048

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の手術不能又は再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1

レジメン識別番号：2017248

療 法 名	パージェタ+ハーセプチン+パクリタキセル 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベルツズマブ	420mg (初回のみ840mg)	点滴	Day1
トラスツズマブ	6m g /kg (初回のみ8mg/kg)	点滴	Day1
パクリタキセル	80m g /㎡	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014042

療 法 名	ペバシズマブ+Weekly Taxol療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能又は再発乳癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80m g /㎡	点滴	Day1・8・15
ペバシズマブ	10m g /kg	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2024397

療 法 名	フェスゴ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		

レジメン識別番号：2024398

療 法 名	フェスゴ+ドセタキセル	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
ドセタキセル	75m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024399

療 法 名	フェスゴ+TC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
ドセタキセル	75m g /㎡	点滴	Day1
シクロフォスファミド	600m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024400

療 法 名	フェスゴ+アブラキサン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
アルブミン懸濁型パクリタキセル	260m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024401

療 法 名	フェスゴ+エリブリン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
エリブリン	1.4m g /㎡	静注	Day1・8

レジメン識別番号：2024402

療 法 名	フェスゴ+ピノレルビン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
ピノレルビン	25m g /㎡	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2024403

療 法 名	フェスゴ+パクリタキセル	1 ク ー ル
対 象 疾 患	HER2陽性の乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
フェスゴIN	初回：IN15mL	皮下注	Day1
フェスゴMA	2回目以降：MA10mL		
パクリタキセル	80m g /㎡	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2024433

療 法 名	カビバセルチブ+フルベストラント	1 ク ー ル
対 象 疾 患	手術不能又は再発乳癌 (内分泌療法後に増悪したPIK3CA、AKT1又はPTEN遺伝子変異を有するホルモン受容体陽性かつHER2陰性)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トルカブ	800mg /日	経口	4日間内服、3日間休薬
フェソロデックス	250mg ×2本	筋注（臀部）	3回目までは2週毎。それ以降は4週毎。

レジメン識別番号：2024439

療 法 名	サシズマブ ゴビデカン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法歴のあるトリプルネガティブ（ホルモン受容体陰性かつHER2陰性）の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
サシズマブ ゴビデカン	10mg g /kg	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014032

療 法 名	アドリアマイシン胸腔内投与 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	癌性胸膜炎（乳癌）	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルピシン	10mg g /㎡	胸腔内	Day1

レジメン識別番号：2025449

療 法 名	ダトボタマブ デルクステカン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ダトボタマブ デルクステカン	6mg g /kg	点滴	Day1

【胸腺癌】

レジメン識別番号：2014004			
療 法 名	術前Ra+CDDP 療法		1 ク ー ル
対 象 疾 患	胸腺癌		26日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	5m g /日	点滴	20回

レジメン識別番号：2014013			
療 法 名	ADOC 療法（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	浸潤性胸腺癌		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	40m g /㎡	点滴	Day1
シスプラチン	50mg/㎡	点滴	Day1
ビンクリスチン	0.6m g /㎡	点滴	Day3
シクロフォスファミド	700mg/㎡	点滴	Day4

レジメン識別番号：2016236			
療 法 名	バクリタキセル・カルボプラチン（一括）療法（胸腺癌・胸腺腫）（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	胸腺癌・胸腺腫		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	200mg /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2021329	
療 法 名	CAMP	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	胸腺腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20mg/m ²	点滴	Day1～4
ドキソルビシン	40mg/m ²	点滴	Day1
メチルプレドニゾン	1000mg/body	点滴	Day1～4
	500mg/body	点滴	Day5～6

【悪性胸膜中皮腫】

レジメン識別番号：2014092			
療 法 名	Pemetrexed/CDDP 療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1
シスプラチン	75mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014095			
療 法 名	Pemetrexed/CBDCA 療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014097			
療 法 名	Pemetrexed 療法		1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムトレキセド	500mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2018265			
療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	化学療法後に増悪した悪性胸膜中皮腫	14日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020319			
療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	化学療法後に増悪した悪性胸膜中皮腫	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022364			
療 法 名	ニボルマブ+イピリムマブ		1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胸膜中皮腫		42日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360mg/body	点滴	Day1・22
イピリムマブ	1mg/kg	点滴	Day1

【卵巣癌】

レジメン識別番号：		2014006	
療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2014106	
療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70mg /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2014107	
療 法 名	Week l y TJ ① 療法（加林°ﾌﾟﾗチﾝは一括投与） （イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70mg /㎡	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2014109	
療 法 名	DP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	卵巣癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60mg /㎡	点滴	Day1
シスプラチン	80mg /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2014112	
療 法 名	CPT-11単剤療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発卵巣癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100mg /㎡	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：		2014116	
療 法 名	TP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	卵巣癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175mg /㎡	点滴	Day1
シスプラチン	75mg /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014117			
療 法 名	ドキシル療法		1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌		28日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ト [®] キル [®] シ [®] リホ [®] ソム製剤（ドキシル）	50mg g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014120			
療 法 名	GEM療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した卵巣癌	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタピン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014121			
療 法 名	ノギテカン療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した卵巣癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ノギテカン	1.5m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2014122			
療 法 名	シスプラチン単剤療法（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014123			
療 法 名	dose dense TC 療法（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80mg /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014124			
療 法 名	CBDCA/GEM療法（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014128			
療 法 名	カルボプラチン単剤療法（イメンド併用）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014125

療 法 名	ペバシズマブ+TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014126

療 法 名	ペバシズマブ単剤療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014127

療 法 名	ペバシズマブ+DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022351

療 法 名	ペバシズマブ+オラパリブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌・腹膜癌・卵管癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オラパリブ	300mg * 2	内服	Day1～21
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024418

療 法 名	リボソーマルドキソルピシシン+カルボプラチン+ペバシズマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキシソルピシシン リボソーム製剤（ドキシル）	30m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024419

療 法 名	リボソーマルドキソルピシシン+ペバシズマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキシソルピシシン リボソーム製剤（ドキシル）	50m g /㎡	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024420

療 法 名	GEM+CBDCA+ペバシズマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC =4	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024421

療 法 名	GEM+ペバシズマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /㎡	点滴	Day1・8・15
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024422

療 法 名	ネダプラチン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	卵巣癌、卵管癌、腹膜癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネダプラチン	100m g /㎡	点滴	Day1

【子宮頸癌】

レジメン識別番号：2014006			
療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014106			
療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014107			
療 法 名	W e e k l y TJ ① 療法（加林`ﾌﾟﾗﾁﾝは一括投与）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮頸癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70m g /㎡	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014110			
療 法 名	シスプラチン/Ra療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮頸癌	7日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014115			
療 法 名	CPT-11／MMC療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮頸癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100m g /㎡	点滴	Day1・8・15
マイトマイシン	10m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024412-1			
療 法 名	Pembrolizumab+TC+Bev	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	進行再発子宮頸癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
パクリタキセル	175m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024412-2

療 法 名	Pembrolizumab+Bev維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024413

療 法 名	IRI+Bev	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行再発子宮頸癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100mg/m ²	点滴	Day1・8・15
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024423

療 法 名	セミプリマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行再発の子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セミプリマブ	350mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025452

療 法 名	チソツマブ ベドチン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発子宮頸癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
チソツマブ ベドチン	2mg/kg（最大200mg）	点滴	Day1

【子宮体癌】

レジメン識別番号：2014006

療 法 名	TJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014106

療 法 名	DJ療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014107

療 法 名	W e e k l y TJ ① 療法（カル*プラチンは一括投与） （イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	60～70m g /㎡	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014113

療 法 名	AP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	50m g /㎡	点滴	Day1
ドキソルビシン	60m g /㎡	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022350-1

療 法 名	ベムプロリズマブ（3週）+レンパチニブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮 体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
レンパチニブ	20mg/body	内服	Day1～21

レジメン識別番号： 2022350-2

療 法 名	ペムブロリズマブ（6週）+レンパチニブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した切除不能な進行・再発の子宮体癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1
レンパチニブ	20mg/body	内服	Day1～42

レジメン識別番号： 2024440

療 法 名	Durvalumab+TC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1120mg/body	点滴	Day1
パクリタキセル	175m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝6	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2024441

療 法 名	Durvalumab+DC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1120mg/body	点滴	Day1
ドセタキセル	70m g /㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2024442

療 法 名	Durvalumab維持（子宮体癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴	Day1
	30kg以下の場合は20mg/kgとする		

レジメン識別番号： 2024443

療 法 名	Durvalumab＋オラパリブ併用維持（子宮体癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	ミスマッチ修復機能正常（pMMR）の進行・再発子宮体癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500mg/body	点滴	Day1
	30kg以下の場合は20mg/kgとする		
オラパリブ	300mg/回、1日2回	内服	連日

レジメン識別番号： 2024444

療 法 名	Pembrolizumab+TC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
パクリタキセル	175mg/㎡	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC＝5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024445

療 法 名	Pembrolizumab+DC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
ドセタキセル	70mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024446

療 法 名	Pembrolizumab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	進行・再発子宮体癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1

【子宮平滑筋肉腫】

レジメン識別番号：		2014114	
療 法 名	GEM/DOC療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮平滑筋肉腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	800mg / m ²	点滴	Day1・8
ドセタキセル	70mg / m ²	点滴	Day8

レジメン識別番号：		2024411	
療 法 名	ドキソルピシン	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮肉腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルピシン	60mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2024414	
療 法 名	エリブリン	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	子宮肉腫・卵巣肉腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エリブリン	1.4mg/m ²	静注	Day1・8

レジメン識別番号：		2024424	
療 法 名	トラベクテジン	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	悪性軟部腫瘍（子宮肉腫・卵巣肉腫・腔原発肉腫など）	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
トラベクテジン	1.2mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2024425	
療 法 名	ドキソルピシン+イホスファミド	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	平滑筋肉腫	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルピシン	30mg/m ²	点滴	Day1・2
イホスファミド	2000mg/m ²	点滴	Day1-5

【絨毛性疾患】

レジメン識別番号：2014108

療 法 名	EMA／CO療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患（絨毛癌）	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イトボシド	100m g /m ²	点滴	Day1・2
アクチノマイシンD	0.5m g /body	点滴	Day1・2
メソトレキサート	100m g /m ²	静注	Day1
メソトレキサート	200m g /m ²	点滴	Day1
ビンクリスチン	1m g /m ²	点滴	Day8
シクロフォスファミド	600mg/m ²	点滴	Day8

レジメン識別番号：2014118

療 法 名	メソトレキサート療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メソトレキサート	0.4m g /kg	筋注	Day1～5

レジメン識別番号：2014119

療 法 名	アクチノマイシンD療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	絨毛性疾患	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アクチノマイシンD	0.01m g /kg	静注	Day1～5

【尿路上皮癌・膀胱癌】

レジメン識別番号：2014140

療 法 名	T H P – I c I 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビラルビシ	30mg/body	膀胱内	Day1

レジメン識別番号：2014141

療 法 名	M M C 膀胱内注入療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
マイトマイシンC	10～40mg/body	膀胱内	Day1

レジメン識別番号：2014142

療 法 名	M-VAC療法（イメンD併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メソトレキサート	25m g /m ²	点滴	Day1・15・22
ビンブラスチン	3m g /m ²	点滴	Day1・15・22
ドキソルビシン	30m g /m ²	点滴	Day2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号：2014143

療 法 名	G D C 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	750m g /m ²	点滴	Day1・8
ドセタキセル	50m g /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	200m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014144

療 法 名	Low d o s e CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	25日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20m g /body	点滴	Day1・3・5・8・10

レジメン識別番号：2014145

療 法 名	GEM + CBDCA（200mg/m ² ）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	膀胱癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	750m g /m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	200m g /m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号：2014147

療 法 名	GEM + CDDP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8・15
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号：	2014149		
療 法 名	GEM+CBDCA（AUC=5）療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿路上皮癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタピン	1000m g /m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2014222		
療 法 名	CDDP+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿道癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	750m g /m ²	点滴	Day1・2・3

レジメン識別番号：	2018262		
療 法 名	ペムブロリズマブ（3週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2020303		
療 法 名	Weekly PTX	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：	2020304		
療 法 名	PTX+CBDCA	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿路上皮癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	175m g /m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2020305		
療 法 名	Weekly PTX+GEM	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8・15
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：	2020306		
療 法 名	PTX+CDDP+GEM	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	尿路上皮癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	80m g /m ²	点滴	Day1・8
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
ゲムシタピン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：	2020309		
療 法 名	ペムブロリズマブ（6週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌	42日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021333

療 法 名	アベルマブ維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な尿路上皮癌における化学療法後の維持	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アベルマブ	10mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022352

療 法 名	エンホルツマブ ベドチン	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮癌 (PD-1/PD-L1阻害剤による治療歴のある患者が対象)	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg（最大125mg）	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2022366

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌における術後補助療法	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022367

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌における術後補助療法	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024396

療 法 名	dose-dense M-VAC	1 ク ー ル
対 象 疾 患	尿路上皮癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
メソトレキサート	30mg/m ²	点滴	Day1
ビンブラスチン	3mg/m ²	点滴	Day2
ドキソルビシン	30mg/m ²	点滴	Day2
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day2

レジメン識別番号：2024434

療 法 名	エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ(3週)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg（最大125mg）	点滴	Day1・8
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024435

療 法 名	エンホルツマブ ベドチン+ペムブロリズマブ(6週)	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg（最大125mg）	点滴	Day1・8・22・29
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025447

療 法 名	ニボルマブ+GEM+CDDP	1 ク ー ル
対 象 疾 患	未治療の根治切除不能な尿路上皮癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360mg/body	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	Day1・8
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025448-1

療 法 名	ニボルマブ維持（2週）（尿路上皮癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な尿路上皮癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025448-2

療 法 名	ニボルマブ維持（4週）（尿路上皮癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な尿路上皮癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1

【前立腺癌】

レジメン識別番号：2014146

療 法 名	ドセタキセル療法（前立腺癌）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	前立腺癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	70m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2015226

療 法 名	カバジタキセル療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	前立腺癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カバジタキセル	20m g /m ²	点滴	Day1

【腎細胞癌】

レジメン識別番号：2014148			
療 法 名	テムシロリムス療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	7日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テムシロリムス	25mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2016239-2			
療 法 名	ニボルマブ療法（2週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	14日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2018268			
療 法 名	ニボルマブ＋イピリムマブ併用療法（腎細胞癌）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌 （IMDCリスク分類がintermediate又はpoorリスクの患		21日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1
イピリムマブ	1mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020315			
療 法 名	ニボルマブ療法（4週）		1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌		28日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021332			
療 法 名	アベルマブ＋アキシチニブ		1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌		14日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アベルマブ	10mg/kg	点滴	Day1
アキシチニブ	5mg＊2/body	内服	Day1～14

レジメン識別番号：2021334			
療 法 名	ベムプロリスマブ（3週）＋アキシチニブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリスマブ	200mg/body	点滴	Day1
アキシチニブ	5mg＊2/body	内服	Day1～21

レジメン識別番号：2021335			
療 法 名	ベムプロリスマブ（6週）＋アキシチニブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	42日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリスマブ	400mg/body	点滴	Day1
アキシチニブ	5mg＊2/body	内服	Day1～42

レジメン識別番号：2022354-1			
療 法 名	ニボルマブ（2週）+カボザンチニブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	14日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240mg/body	点滴	Day1
カボザンチニブ	40mg/body	内服	Day1～14

レジメン識別番号：2022354-2

療 法 名	ニボルマブ（4週）+カボザンチニブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480mg/body	点滴	Day1
カボザンチニブ	40mg/body	内服	Day1～28

レジメン識別番号：2022382-1

療 法 名	ベムブロリズマブ（3週）+レンパチニブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1
レンパチニブ	20mg/body	内服	Day1～21

レジメン識別番号：2022382-2

療 法 名	ベムブロリズマブ（6週）+レンパチニブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能又は転移性の腎細胞癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1
レンパチニブ	20mg/body	内服	Day1～42

レジメン識別番号：2022383-1

療 法 名	ベムブロリズマブ（3週）（術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	腎細胞癌の術後補助療法	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022383-2

療 法 名	ベムブロリズマブ（6週）（術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	腎細胞癌の術後補助療法	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400mg/body	点滴	Day1

【精巣腫瘍、胚細胞腫瘍】

レジメン識別番号：		2014007
療 法 名	BEP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性胚細胞腫 精巣腫瘍	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
プレオマイシン	30m g/body	静注	Day2・9・16
エトポシド	100m g/m ²	点滴	Day1～5
シスプラチン	20mg/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：		2014016
療 法 名	VIP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胚細胞性腫瘍、精巣腫瘍	20日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5
イホスファミド	1.2g/m ²	点滴	Day1～5
エトポシド	75m g/m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：		2014017
療 法 名	V e I P療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	胚細胞性腫瘍	20日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5
イホスファミド	1.2g/m ²	点滴	Day1～5
ビンブラスチン	0.11m g/kg	点滴	Day1・2

レジメン識別番号：		2014150
療 法 名	TIP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	精巣腫瘍、性腺外胚細胞腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	250m g/m ²	点滴	Day1
イホスファミド	1500mg/m ²	点滴	Day2～5
シスプラチン	25m g/m ²	点滴	Day2～5

レジメン識別番号：		2014151
療 法 名	EP 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	精巣腫瘍	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	100m g/m ²	点滴	Day1～5
シスプラチン	20m g/m ²	点滴	Day1～5

【頭頸部癌】

レジメン識別番号：2014002			
療 法 名	CDDP+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2014109			
療 法 名	DP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	80m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：		2014129	
療 法 名	CBDCa/UFT療法（イメンド併用）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	35日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ウラシル（U F T）	400mg /body	経口	Day8～35
カルボプラチン	AUC = 4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014130			
療 法 名	week l y ドセタキセル療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	28日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	30m g /m ²	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014131			
療 法 名	CDDP/Ra（放射線の増感作用）療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	30m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014132			
療 法 名	CBDCA/Ra（放射線の増感作用）療法		1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌		7日
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC = 1	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014133			
療 法 名	ドセタキセル放射線併用療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日	
使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	10m g /m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014134

療 法 名	CAP療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部腺系癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	40m g /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	60m g /m ²	点滴	Day1
シクロフォスファミド	500mg/body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2014135

療 法 名	DTX+CDDP+ 5 -FU（TPF）療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60m g /m ²	点滴	Day1
シスプラチン	60m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号： 2014138

療 法 名	CBDCa+5-FU療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号： 2017249-2

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240m g /body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020297

療 法 名	ベムプロリズマブ（3週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズマブ	200m g /body	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020298

療 法 名	ベムプロリズマブ+CDDP+5-FU	1 ク ー ル
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリズマブ	200m g /body	点滴	Day1
シスプラチン	70mg/m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号：	2020299		
療 法 名	ベムブロリズマブ+CBDDCA+5-FU	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200m g/body	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
フルオロウラシル	700mg/m ²	点滴	Day1～4

レジメン識別番号：	2020300		
療 法 名	ベムブロリズマブ維持（3週）（化学療法との併用後）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200m g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2020312		
療 法 名	ベムブロリズマブ（6週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	42日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400m g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2020313		
療 法 名	ベムブロリズマブ維持（6週）（化学療法との併用後）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	42日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	400m g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2020316		
療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	再発又は遠隔転移を有する頭頸部癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480m g/body	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2022353		
療 法 名	CDDP+RT	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	100mg/m ²	点滴	Day1

※放射線治療中に最大3回投与する。

レジメン識別番号：	2016234		
療 法 名	セツキシマブ+パクリタキセル療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	頭頸部癌	56日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15・22・29・36・43・50
パクリタキセル	80m g/m ²	点滴	Day 1・8・15・22・29・36

レジメン識別番号：2014136

療 法 名	セツキシマブ+CDDP+5-FU 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15
シスプラチン	70m g /m ²	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2014137

療 法 名	セツキシマブ放射線併用 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1

レジメン識別番号：2014139

療 法 名	セツキシマブ+CBDCA+5-FU 療法（イメンド併用）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	初回のみ：400mg/m ² 2回目以降：250mg/m ²	点滴	Day 1・8・15
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1
フルオロウラシル（5-FU）	700m g /m ²	点滴	Day1～5

レジメン識別番号：2015224

療 法 名	セツキシマブ後治療 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	頭頸部癌	7日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
セツキシマブ	250mg/m ² (2回目以降の投与量)	点滴	Day 1

レジメン識別番号：2014161

療 法 名	CDDP 放射線併用	1 ク ー ル
対 象 疾 患	鼻腔腫瘍・舌癌・上顎洞腫瘍・肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	最大投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	100m g /body	動注	Day1

【悪性黒色腫】

レジメン識別番号：2014152

療 法 名	DAV-Feron 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	悪性黒色腫	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
タカルバジン	100m g /body	静注	Day1～5
ビンクリスチン	1m g /body	静注	Day1
ニムスチン	100m g /body	静注	Day1
インターフェロンβ	300万国際単位/body	皮下注	Day1～5

レジメン識別番号：2017244-2

療 法 名	ニボルマブ（2週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な悪性黒色腫	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	240m g /body	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020320

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	根治切除不能な悪性黒色腫	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480m g /body	点滴	Day1

【軟部肉腫】

レジメン識別番号：2014153

療 法 名	MAID 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	軟部肉腫	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドキソルビシン	20m g /m ²	点滴	Day1・2・3
ダカルバジン	300m g /m ²	点滴	Day1・2・3
イホスファミド	2500m g /m ²	点滴	Day1・2・3

【固形癌共通の免疫チェックポイント阻害薬】

レジメン識別番号：2014272-1

療 法 名	ペムブロリズマブ（3週） （マクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌以外の固形癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌以外の固形癌(標準治療が困難な場合に限る。)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200mg/body	点滴	D a y 1

※結腸・直腸癌に使用するペムブロリズマブ療法については、大腸癌のレジメンを参照。

レジメン識別番号：2020310

療 法 名	ペムブロリズマブ（6週） （マクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌以外の固形癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した進行・再発高頻度マクロサテライト不安定性（MSI-High）を有する結腸・直腸癌以外の固形癌(標準治療が困難な場合に限る。)	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400mg/body	点滴	D a y 1

※結腸・直腸癌に使用するペムブロリズマブ療法については、大腸癌のレジメンを参照。

【非小細胞肺癌】

レジメン識別番号：2014005

療 法 名	ドセタキセル療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ドセタキセル	60mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014019

療 法 名	ナベルピン療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビノレルピン	25mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014027

療 法 名	ペバシズマブ+Pemetrexed/CDDP療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペマトレキセド	500mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75mg/m2	点滴	Day1
ペバシズマブ	15mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014031

療 法 名	CDDP+CPT-11療法	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60mg/m2	点滴	Day1
イリノテカン	60mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014052

療 法 名	CDDP/CPT-11療法（分割）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40mg/m2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014078

療 法 名	CBDCA/TXT療法（一括）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1
ドセタキセル	60mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014079

療 法 名	GEM/VNR療法（分割）	1	ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28	日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000mg/m2	点滴	Day1・15
ビノレルピン	25mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014080

療 法 名	GEM療法（呼吸器科）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014086

療 法 名	CBDCA/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014087

療 法 名	TS-1/CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	35日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	経口	Day1～21
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day8(or 15 or 21)

レジメン識別番号：2014088

療 法 名	CBDCA/PTX（一括）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014089

療 法 名	CBDCA/GEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m2	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014090

療 法 名	Weekly PTX/CBDCA 療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
バクリタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014091

療 法 名	CDDP/VNR療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80 mg/m2	点滴	Day1
ビンレルビン	25 mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2014092

療 法 名	PEM/CDDP療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014096

療 法 名	Weekly PTX療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	80 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014097

療 法 名	PEM療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014098

療 法 名	ペバシズマブ+ CBDCA/PTX（一括）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014099

療 法 名	ペバシズマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014100

療 法 名	TS-1/CBDCA療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	経口	Day1～14
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：2014101

療 法 名	PEM/CBDCA療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=4	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2014102		
療 法 名	PEM/CBDCA/Bev療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2014103		
療 法 名	PEM/Bev療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2014104		
療 法 名	Weekly nab-PTX療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型バクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：	2014105		
療 法 名	Weekly nab-PTX + CBDCA療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アルブミン懸濁型バクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2016232-2		
療 法 名	ニボルマブ療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	240 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2016235		
療 法 名	ラムシルマブ+ドセタキセル療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	治癒切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2016237		
療 法 名	CDDP + TS-1 + 同時併用放射線療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	経口	Day1～14
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2016238		
療 法 名	CDDP + VNR + 同時併用放射線同時併用放射線療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1
ビルレルピン	20 mg/m2	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2016241

療 法 名	PTX（一括単独）療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2017245

療 法 名	Weekly CBDCA+PTX同時胸部放射線療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	63日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
パクリタキセル	40 mg/m2	点滴	Day1・8・15・22・29・36
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・8・15・22・29・36

レジメン識別番号：2017247

療 法 名	ベムブロリズマブ療法（非小細胞肺癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2017251

療 法 名	ペバシズマブ/エルロチニブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1
エルロチニブ	150 mg/bod	経口	Day1～21

レジメン識別番号：2018263

療 法 名	アテゾリズマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(2nd line以降)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2018264

療 法 名	デュルバルマブ療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化	14日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019269-1

療 法 名	PEM/CBDCA/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019269-2

療 法 名	SH CDDP/PEM/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019269-3

療 法 名	PEM/Pembrolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019270

療 法 名	CBDCa/PTX/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
バクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019271

療 法 名	Weekly nab-PTX/CBDCA/Pembrolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
アルブミン懸濁型バクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019273

療 法 名	Pembrolizumab維持療法（非小細胞肺癌：化学療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019274

療 法 名	CBDCa/PTX/Bev/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
パクリタキセル	175 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019275

療 法 名	Bev/Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	化学療法未治療の切除不能な進行・再発の非小細胞肺	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020289-1

療 法 名	CBDCa/nab-PTX/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020289-2

療 法 名	Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020290-1

療 法 名	CBDCa/PEM/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=6	点滴	Day1

レジメン識別番号：2020290-2

療 法 名	PEM/Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(非扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020291-1

療 法 名	CBDCA/PEM/Gefitinib療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌(非扁平上皮	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イレッサ	250 mg/bod	経口	Day1～21
ベムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020291-2

療 法 名	PEM/Gefitinib維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌(非扁平上皮	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イレッサ	250 mg/bod	経口	Day1～21
ベムトレキセド	500 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020292-1

療 法 名	SH CDDP/GEM/Necitumumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネシツムマブ	800 mg/bod	点滴	Day1・8
ゲムシタピン	1000 mg/m2	点滴	Day1・8
シスプラチン	75 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020292-2

療 法 名	Necitumumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌(扁平上皮癌)	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネシツムマブ	800 mg/bod	点滴	Day1・8

レジメン識別番号： 2020307

療 法 名	ベムプロリスマブ（6週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリスマブ	400 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020308

療 法 名	ベムプロリスマブ維持（6週）（化学療法との併用後）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ベムプロリスマブ	400 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号： 2020314

療 法 名	ニボルマブ（4週）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	480 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2021323		
療 法 名	ニボルマブ+イピリムマブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	42日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360 mg/bod	点滴	Day1・22
イピリムマブ	1 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2021327		
療 法 名	ラムシルマブ+ゲフィチニブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1
ゲフィチニブ	250 mg/bod	内服	Day1～14

レジメン識別番号：	2021328		
療 法 名	ラムシルマブ+エルロチニブ	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の非小細胞肺癌	14日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ラムシルマブ	10 mg/kg	点滴	Day1
エルロチニブ	150 mg/bod	内服	Day1～14

レジメン識別番号：	2022355		
療 法 名	S-1+DTX	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m2	内服	Day1～7、15～21
ドセタキセル	35 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：	2022356		
療 法 名	GEM（d1、8、15）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタピン	1000 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：	2022358		
療 法 名	CDGP+DTX	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ネダプラチン	100 mg/m2	点滴	Day1
ドセタキセル	60 mg/m2	点滴	Day1

レジメン識別番号：	2022359		
療 法 名	IPI+NIVO+CBDCA+PEM	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	42日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360 mg/bod	点滴	Day1・22
イピリムマブ	1 mg/kg	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1・22
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1・22

レジメン識別番号：	2022360		
療 法 名	Bev+VNR	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ビルルビン	25 mg/m ²	点滴	Day1・8
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022361

療 法 名	Bev+CBDCA+Weekly nab-PTX	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1
アルブミン懸濁型パクリタキセル	100 mg/m ²	点滴	Day1・8・15
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022362

療 法 名	Bev+CBDCA+S-1	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム（S-1）	80 mg/m ²	内服	Day1～14
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022363

療 法 名	Bev+CBDCA+GEM	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴	Day1・8
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1
ペバシズマブ	15 mg/kg	点滴	Day1

レジメン識別番号：2022379

療 法 名	アテゾリズマブ術後補助	1 ク ー ル
対 象 疾 患	PD-L1陽性の非小細胞肺癌の術後補助療法	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2023391

療 法 名	CDDP+PEM+Nivolumab（術前補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（非扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360 mg/bod	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m ²	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2023392

療 法 名	CBDCa+PTX+Nivolumab（術前補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ニボルマブ	360 mg/bod	点滴	Day1
パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2023394

療 法 名	デュルバルマブ	1 ク ー ル
対 象 疾 患	切除不能な局所進行の非小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法(投与期間は12ヶ月間まで)	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/bod 30kg以下の場合は20mg/kgとする	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024437

療 法 名	SH：CDDP+GEM+Pembrolizumab（術前補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1
シスプラチン	75 mg/m ²	点滴	Day1
ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴	Day1・8

レジメン識別番号：2024438-1

療 法 名	Pembrolizumab（3週毎）（術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2024438-2

療 法 名	Pembrolizumab（6週毎）（術後補助）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	非小細胞肺癌（扁平上皮癌）	42日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ペムブロリズマブ	400 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025459-1

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg以上】（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	350 mg/bod	点滴	Day1
	1400 mg/bod	点滴	Day2
	1750 mg/bod	点滴	Day8・15
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025459-2

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg以上】（2サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1750 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025459-3

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg以上】（3・4サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	2100 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025459-4

療 法 名	アミバンタマブ+PEM【80kg以上】（5サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	2100 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025460-1

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg未満】（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	350 mg/bod	点滴	Day1
	1050 mg/bod	点滴	Day2
	1400 mg/bod	点滴	Day8・15
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025460-2

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg未満】（2サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1400 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025460-3

療 法 名	アミバンタマブ+CBDCA+PEM【80kg未満】（3・4サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1750 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025460-4

療 法 名	アミバンタマブ+PEM【80kg未満】（5サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子エクソン20挿入変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日
	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌(二次治療以降)	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1750 mg/bod	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025461-1

療 法 名	アミバンタマブ+ラゼルチニブ【80kg以上】（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	350 mg/bod	点滴	Day1
	1050 mg/bod	点滴	Day2
	1400 mg/bod	点滴	Day8・15・22
ラゼルチニブ	240 mg/日	経口	Day1～28

レジメン識別番号：2025461-2

療 法 名	アミバンタマブ+ラゼルチニブ【80kg以上】（2サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1400 mg/bod	点滴	Day1・15
ラゼルチニブ	240 mg/日	経口	Day1～28

レジメン識別番号：2025462-1

療 法 名	アミバンタマブ+ラゼルチニブ【80kg未満】（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	350 mg/bod	点滴	Day1
	700 mg/bod	点滴	Day2
	1050 mg/bod	点滴	Day8・15・22
ラゼルチニブ	240 mg/日	経口	Day1～28

レジメン識別番号：2025462-2

療 法 名	アミバンタマブ+ラゼルチニブ【80kg未満】（2サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アミバンタマブ	1050 mg/bod	点滴	Day1・15
ラゼルチニブ	240 mg/日	経口	Day1～28

レジメン識別番号：2025464

療 法 名	SH：オシメルチニブ+CDDP+PEM	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オシメルチニブ	80mg mg/日	経口	Day1～21
シスプラチン	75 mg/m ²	点滴	Day1
ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025465

療 法 名	オシメルチニブ+CBDCA+PEM	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オシメルチニブ	80mg mg/日	経口	Day1～21
カルボプラチン	AUC = 5	点滴	Day1
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

レジメン識別番号：2025466

療 法 名	オシメルチニブ+PEM維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	EGFR遺伝子変異陽性の切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
オシメルチニブ	80mg mg/日	経口	Day1～21
ペムトレキセド	500 mg/m ²	点滴	Day1

【小細胞肺癌】

レジメン識別番号：2014031			
療 法 名	CDDP+CPT-11療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	60 mg/m2	点滴	Day1
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2014052			
療 法 名	CDDP/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	40 mg/m2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2014077			
療 法 名	CDDP/VP-16（PE）療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
シスプラチン	80 mg/m2	点滴	Day1
エトポシド	100 mg/m2	点滴	Day1～3

レジメン識別番号：2014082			
療 法 名	ハイカムチン療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
ノギテカン	2 mg/m2	点滴	Day1・2
ノギテカン	1 mg/m2	点滴	Day3

レジメン識別番号：2014085			
療 法 名	アムルピシン療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アムルピシン	35 (Max 40) mg/m2	点滴	Day1～3

レジメン識別番号：2014086			
療 法 名	CBDCA/CPT-11療法（分割）	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
カルボプラチン	AUC=2	点滴	Day1・15
イリノテカン	60 mg/m2	点滴	Day1・15

レジメン識別番号：2018258			
療 法 名	CBDCA/VP-16療法	1 ク ー ル	
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日	

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
エトポシド	80 mg/m2	点滴	Day1～3
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019284

療 法 名	CBDCA/VP-16/Atezolizumab療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1
エトボシド	100 mg/m2	点滴	Day1～3
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2019285

療 法 名	Atezolizumab維持療法	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
アテゾリズマブ	1200 mg/bod	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021324

療 法 名	CBDCA+ETP+Durvalumab	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	21日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/bod	点滴	Day1
	30kg以下は20mg/kg		
エトボシド	100 mg/m2	点滴	Day1～3
カルボプラチン	AUC=5	点滴	Day1

レジメン識別番号：2021324

療 法 名	Durvalumab維持	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/bod	点滴	Day1
	30kg以下は20mg/kg		

レジメン識別番号：2022357

療 法 名	CPT-11	1 ク ー ル
対 象 疾 患	小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
イリノテカン	100 mg/m2	点滴	Day1・8・15

レジメン識別番号：2025450

療 法 名	タラタマブ（1サイクル目）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
タラタマブ	1 mg/bod	点滴	Day1
タラタマブ	10 mg/bod	点滴	Day8・15

レジメン識別番号：2025451

療 法 名	タラタマブ（2サイクル目以降）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	がん化学療法後に増悪した小細胞肺癌	28日

使 用 抗 癌 剤 名	標準投与量	投与ルート	投与日
タラタマブ	10 mg/bod	点滴	Day1・15

レジメン識別番号： 2025463

療 法 名	Durvalumab（限局型小細胞肺癌）	1 ク ー ル
対 象 疾 患	限局型小細胞肺癌における根治的化学放射線療法後の維持療法(投与期間は24ヶ月間まで)	28日

使用抗癌剤名	標準投与量	投与ルート	投与日
デュルバルマブ	1500 mg/bod 30kg以下は20mg/kg	点滴	Day1